

Pflichttext Lenzetto 1,53 mg/Sprühstoß transdermales Spray, Lösung

Lenzetto 1,53 mg/Sprühstoß transdermales Spray, Lösung. Wirkstoff: Estradiol.
Zusammensetzung: Jeder Sprühstoß liefert 90 µl transdermales Spray, Lösung, d. 1,53 mg Estradiol (entspr. 1,58 mg Estradiol-Hemihydrat) enthalten. Sonst. Bestandteile: Octisalal, Ethanol 96 %.
Anwendungsgebiet: Hormonsubstitutionstherapie (HRT) bei Estrogenmangelsymptomen bei postmenopausalen Frauen (bei Frauen, d. letzte Monatsblutung mind. 6 Monate zurückliegt o. mit chirurg. Menopause, mit intaktem o. ohne Uterus). **Gegenanzeigen:** Bestehender o. früherer Brustkrebs bzw. Verdacht; estrogenabh. maligner Tumor bzw. Verdacht; nicht abgeklärte Blutung im Genitalbereich; unbehandelte Endometriumhyperplasie; frühere o. bestehende venöse thromboembolische Erkrankungen; bekannte thrombophile Erkrankung; bestehende o. erst kurze Zeit zurückliegende arterielle thromboembolische Erkrankungen; akute Lebererkrankung o. zurückliegende Lebererkrankung, solange sich d. relevanten Leberenzym-Werte nicht normalisiert haben; Porphyrie; Überempfindlichkeit gg. d. Wirkstoff o. sonst. Bestandteile. **Nebenwirkungen: Häufig:** Kopfschmerz; abdominale Schmerzen, Übelkeit; Hautausschlag, Pruritus; schmerzempfindl. u. schmerzende Brust, Uterus- bzw. Vaginalblutungen einschl. Schmierblutungen, Metrorrhagie; Gewicht erhöht, Gewicht erniedrigt. **Gelegentlich:** Überempfindlichkeitsreaktionen; depressive Verstimmungen, Schlaflosigkeit; Schwindelgefühl; Sehstörungen; Schwindel; Palpitationen; Hypertonie; Diarrhö, Dyspepsie; Erythema nodosum, Urtikaria, Hautreizung; Myalgie; Brustverfärbung, Brustdrüsenabsonderung, Zervixpolyp, Endometriumhyperplasie, Ovarialzyste, Kolpitis; Ödem, Schmerzen i. d. Achselgegend; Gamma-Glutamyltransferase erhöht, Cholesterin im Blut erhöht. **Selten:** Angstzustände, Libido vermindert, Libido gesteigert; Migräne; Kontaktlinsenunverträglichkeit; Blähungen, Erbrechen; Hirsutismus, Akne; Muskelspasmen; Dysmenorrhö, prämenstruationsartiges Syndrom, Brustvergrößerung; Ermüdung. Weitere Nebenwirkungen: Alopezie, Chloasma, Hautverfärbung, erhöhtes Risiko f. Brustkrebs, Endometriumkarzinom, Ovarialkarzinom, venöse Thromboembolien, koronare Herzkrankheit, ischämischer Schlaganfall. **Warnhinweis:** Enthält 65,47 mg Alkohol (Ethanol) pro Sprühstoß, entsprechend 72,74 % w/v. **Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber:** Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Ungarn. **Örtlicher Vertreter:** Gedeon Richter Pharma GmbH, Ettore-Bugatti-Straße 6 – 14, 51149 Köln. **Stand d. Information:** Juli 2026.